


Vogelnieuws uit de Kleiputten

Wanneer we dit afmeten aan het aantal aanvragen voor gidsbeurten en het effectieve aantal geleide wandelingen in het reservaat De Kleiputten, dan moet de belangstelling voor het gebied en meer natuur in eigen streek zeker in de lift zitten. Reken hierbij de soms vreemde, of op zijn minst voor de streek zeldzame diersoorten die vrij recent zijn waargenomen en je hebt redenen te over om het gebied regelmatig eens aan te doen.

De soortenrijkdom heeft een verrassende vlucht genomen nu het omringende domeinbos stilaan tot wasdom komt, waardoor er meer dekking, nestgelegenheid en voedselaanbod is. Dit vertaalt zich onder meer in toevallige passanten die er al eens gemakkelijker verblijven. Denken we voor de laatste jaren aan visarend, purperreiger, roerdomp, kwak, hop, baardmannetje, sprinkhaanzanger, Cetti's zanger, nachtegaal of roodmus. In juni was er zelfs een kroonkraanvogel die er enkele dagen verbleef! Maar of die op eigen vleugels helemaal uit centraal Afrika afkomstig was, is al te hoog gegrepen.



Rietgors (foto: Johan Hanssens)

Het broedseizoen 2007 had ook een aantal verrassingen in petto, wat nogmaals het belang van kleine reservaatjes helpt onderstrepen. Hierna volgt een summier overzicht.

Watervogels als meerkoet, waterhoen en wilde eenden zijn we gewoon als broedvogels, maar waar we vroeger wel eens dodaars als toevallige gast zagen, hadden we dit jaar een stel dodaarzen met jongen. De rietveldjes herbergden verder minstens 3 koppels kleine karekiet en 1 kp. rietgors. Gedurende het ganse broedseizoen zagen we ijsvogel, soms 2 tegelijk. Zeer waarschijnlijk hebben ze hun nestgang in de buurt.

Drie dagroofvogels broeden in de buurt, en gebruiken het gebied als jachtterrein: sperwer, torenvalk en boomvalk. Idem voor ransuil. Alle duivensoorten nestelen er, maar vooral de minstens 2 koppels zomertortels zijn de uitblinkers.

Zowel groene als grote bonte specht en boomkruiper zijn er aanwezig, en gebruiken het gebied minstens als foerageergebied. Idem voor gaaien.

Bij zangvogels broedden er meerdere paren kool-, pimpel en staartmezen, heggenmus, winterkoning, roodborst, zanglijster, en merel. Zeker 1 broedgeval van grote lijster. Langs de gebouwen witte kwikstaart en zwarte roodstaart.

Voor de typische zomergasten telden we de zangposten (zp): tijftjaf (zeker 5 zp), fitis (1zp), zwartkop (minstens 3 zp), tuinfluiter (2zp), grasmus (1zp), spotvogel (1 zp) en bosrietzanger (2zp). Bij vinkachtigen en mussen zeker groenling en huismus, wellicht ook kneu in de omgeving. Koekoek is nauwelijks in het gebied gebleven, eileg in de nesten van de nochtans ruim aanwezige waardvogels is dus onwaarschijnlijk. Zoals eerder vermeld, is dit lijstje onvolledig. Wie nog extra gegevens heeft, wil je ons die bezorgen?

Veel van de bovenvermelde soorten konden we waarnemen tijdens de avondwandeling op 8 juni. Tussen de frisgroene bomen sprongen de vele bruine massieven in het oog van **aangetaste wilgen**, waarbij de bladeren helemaal verdord bleken. De andere boomsoorten hadden hier geen last van. Ook in andere streken, zelfs buiten ons land, stelden we dit fenomeen vast. Wie weet hiermee raad: is dit een insectenaantasting of schimmelinfectie? Kunnen wilgen deze plaag overleven? Wie hierover meer weet, mag ons gerust de info doorsturen. natuur.mandelstreke@scarlet.be

Piet en Dirk