

30



JELLE QUARTIER NATUURSTUDIEBUREAU

WWW.ECOSPOOR.BE

en waar meer dan 300 soorten zijn gestreept (geel). Sommige gebieden bevatten extra veel soorten, meestal doordat die meerdere keren bezocht werden in de laatste 35 jaar; vaak door specialisten zoals

Filip Verloove, een Roeselarenaar
verbonden aan de plantentuin van
Meise.

Wanneer we de vaatplantwaarnemingen van alle gebruikers van waar-

nemingen.be in diezelfde hokken erbij nemen, krijgen we beduidend meer soorten per hok (zie figuur 2 - rechts). Dit komt hoofdzakelijk door de bijdragen van Zwalimop tijdens verschillende 1.000-soortendagen die de voorbije jaren door Regionaal Landschap West-Vlaamse Hart in ons werkingsgebied werden georganiseerd.

Verder kan je zien dat ik voor de totalen de adventieve planten (**)
- in waarnemingen.be aangeduid als 'incidentele invoer' - niet mee-
reken (zie figuur 2 - rechts). Denk
aan soorten als bieslook, cosmos,
echte lavendel, groot akkerscherf,
kanariezaad, korenbloem, langbla-
dige druifhyacint, peer, raapzaad,
ruige rudbeckia, stippelklaverzuring,
weegbreeslangenkruid of zilver-
schildzaad.

Uitzonderingen hierop zijn planten die in meer dan 30 van onze hokken genoteerd worden of invasief zijn. Die worden in de grafieken wel meegeteld. Dit zijn soorten als alsemambrosia, bernagie, boekweit, doornappel, grote teunisbloem, harig vingergras, inkarnaatklaver; Italiaanse aronskelk, juffertje-in-'t-groen, kleine majer, okkernoot, phacelia, rode ribes, ruige fijnstraal, schaafstro, slaapbol, slaapmutsje.

						155	25	21	35	101		
			207	162	25	8	33	216	54	248	195	
		132	6	159	27	3	16	33	213	252	278	40
6	34	135	53	162	118	8	190	103	37	30	96	250
											92	62
175	3	22	211	169	8	186	59	159	183	81	300	201
117	4	159	136	47	15	199	204	61	195	221	297	267
176	263	258	29	2	110	2	36	141	84	217	228	390
202	262	165	5	197	3	80	177	26	39	65	292	339
		162	2	255	124	18	249	145	220	210	273	281
		5	19	130	146	30	112	6	41	124	243	110
		6	9			1	11	23	179	50	220	433
						10	258	78	117	20	224	188
		PASSENGER	20	67	19	193	199	33	113	45	12	7
		LINDBLAD	185	92	230	21	2	150	140	146	20	144
		146	23	204	17	51	2	13	73	16	144	35
Zonnebeke		2	16	9	159	19	140	31	180	145	11	165
			103	165	3	191	104	18	216	33	42	182
			115	74	1	106	89	37	279	40	13	7
					2	163	249	13	90	7		
						3	166	55	222			

steeneik, stijf ijzerhard, tuingoudsbloem, tuinkaasjeskruid, tuinradijs, tuinviooltje, vlas, witte mosterd en zonnebloem.

De in waarnemingen.be als ingeburgerd aangemerkte planten heb ik wél meegeteld, zoals beklirde basterdwederik, Canadese fijnstraal, Europese hanenpoot, grote ereprijs, harig knopkruid, hoge fijnstraal, Italiaans raaigras, kleine varkenskers, kruisbladige wolfsmelk, luzerne, oranje havikskruid en schijfkamille. Daarbij zijn er veel invasieve soorten, zoals vlakke dwergmispel, bleek cypersgras, Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, reuzenbalsemien, Mahonia, Amerikaanse vogelkers, Robinia, rimpelroos, bezemkruiskruid, late guldenroede en sneeuwbes.

Er zijn wel enkele regels waar we ons bij het 'strepen' aan moeten houden. Zo tellen planten die werden aangeplant of ingezaaid in parken, perkjes of tuinen nooit mee. Ook aangeplante of ingezaaide akkerbouwgewassen tellen niet mee, tenzij het om spontane vestiging gaat. Vrijwel alle Vlaamse bossen zijn aangeplant en mogen dus ook niet meegeteld worden, tenzij het gaat om verwildering van die aanplant. Veel voorkomende adventieve en ingeburgerde soorten tellen dan weer wel mee, op voorwaarde dat ze spontaan zijn opgeschoten in verwilderde hoekjes of wegbermen.

Tot slot wil ik deze grafieken graag gebruiken om de planning voor het volgende streepseizoen te maken. Tetraden waar slechts één kwartierhok gestreept is, zouden volgens mij gerust een extra bezoek kunnen gebruiken. Hetzelfde voor hokken waar minder dan 100 soorten werden gezien, zoals dI-45-4. Ook zijn er nog een aantal hokken in het zwarte-



Planteninventarisatie tijdens het 1.000-soortenweekend in Ledegem en Moorslede, in juni 2023.

gatenproject die onvoldoende recent geïnventariseerd werden (allemaal rood omlijnd in figuur 2 - rechts). Hieraan voeg ik nog het voor 2025 geselecteerde hok voor het 'Meetnet Algemene Planten' toe (blauw omlijnd) en het hok rond het Roulartabos (oranje omlijnd), waarvan ik de evolutie wil blijven volgen. Daaruit volgt deze keuze voor dit jaar:

- Do NM 01/05 dI-48-43 Pilders
- Za NM 10/05 dI-57-24 RLT
- Zo VM 25/05 dI-45-44 Staden-dreve
- Za NM 07/06 eI-27-23 Dadi-park
- Za NM 14/06 eI-16-34 Mispelaarhoek
- Za NM 28/06 dI-47-33 Ondank
- Zo VM 06/07 dI-38-44 Kapelhoek
- Za NM 02/08 dI-35-34 Terrest
- Zo VM 31/08 dI-56-31 Zeugeberg

Zin om mee te doen of gewoon je planten (beter) te leren kennen? De concrete afspraakplaat-

sen en tijdstippen vind je terug in de activiteitenkalender.

En als uitsmijter: de 2 soorten die in de meeste hokken gezien worden zijn grote brandnetel en fluitenkruid. Maar dit is slechts in 143 van de 233 hokken, dus een goede 60 %. Als je naar het talrijkste voorkomen over de tetraden heen kijkt, is de akkerdistel de winnaar: die wordt in 63 van de 66 tetraden genoteerd. En omdat we zien dat ongeveer 20 % van de soorten in de soortenrijkste hokken niet-inheemse ingeburgerde soorten zijn, nemen we als extra doelstelling mee om daar dit jaar wat meer aandacht aan te besteden.

Tekst en foto's: Philippe Deprez

(*) Meer info over het IFBL-raster en IFBL-kartering vind je op www.natuurpunt.be/werkgroepen/fon-plantenwerkgroep-01/werking/ifbl-kartering

(**) Een adventieve plantensoort is een soort die toevallig wordt ingevoerd in een gebied waarin ze normaal niet voorkomt, maar zich in haar nieuwe omgeving meestal niet weet te handhaven.